



COMFORT CORN

GB

COMFORT CORN - Corn plasters with salicylic acid

Packaging: 6 plasters containing active substance for corns with salicylic acid.

Pressure relief plasters with salicylic acid protect against painful pressure of skin changes and friction and provide support in the safe and effective removal of corns. They reduce pressure on the painful spot and immediately relieve pain due to pressure. Wearing the corn plaster for longer periods keeps air from the affected site, the affected skin is softened and water builds up in the keratin. The skin or the horny cell conglomeration which have been softened in this manner are then easily removed. Corn removal is supported by the active ingredients salicylic acid, lactic acid, salopins, turpentine and copalva balm which are contained in the plaster core.

Composition: salicylic acid, lactic acid, lanolin, yellow wax, spruce resin, poly(ethylene-co-vinylacetate), iris rootstock, turpentine, copalva balm, adhesive, nonwoven, paper.

Use: Use as directed. First remove the backing film. Apply the plaster on a clean and dry foot placing the felt ring around the corn to protect the affected site against pressure and friction, bringing immediate relief. Apply the plaster properly so that the corn area is occluded. The mass in the nonwoven ring contains salicylic acid, lactic acid and other supportive ingredients which make it easier to remove the corn. Wear the plasters until the corn is removed, but no longer than 10-14 days. Each plaster can be worn for max. 24 hours. Having finished the treatment, the middle part of the corn can be removed using a warm footbath with bath salts and soap. If the skin appears reddened and tender during the treatment, wait with application of next plasters.

Precautions: This plaster is intended for one-time external self-application only onto the affected skin area (corn). Do not use in case of: known hypersensitivity to salicylic acid, salicylates and all other ingredients of the corn plaster, in infants or babies, on damaged skin (e.g. infections, wounds, eczema), in patients with impaired kidney function (kidney failure), diabetes, circulation disorders or inflamed blood vessels. Salicylic acid may increase skin permeability for other locally applied medications. The plaster for corns with salicylic acid must not come into contact with the mucous membranes. In particular, avoid contact with the eyes, and do not apply on the face. During pregnancy, the corn plaster must only be used on skin areas less than 5 cm². During lactation, the plasters should not be used in the breast area. If in doubt, consult your doctor.

Storage: Store in dry place, at room temperature. Keep out of the reach of children.

DE

COMFORT CORN - Hühneraugenplaster mit Salicylsäure

Inhalt: 6 Hühneraugenplaster mit Salicylsäure

Hühneraugenplaster mit Salicylsäure sind zum Schutz vor schmerzhaften Druck der Hautveränderungen vorgesehen, schützen vor Schürfrungen und helfen bei effektiver und sicherer Entfernung von Hühneraugen. Sie vermindern den Druck auf die Schmerzstellen und bringen sofortige Linderung. Durch lange Tragung des Pflasters und Luftabschneidung wird die Haut sandt und im Keratin sammelt sich Wasser. Dank diesem Vorgang kann die Haut oder das hornige Zellenkonglomerat eingeweicht und problemlos beseitigt werden. Das Entfernen des Hühnerauges wird durch die im Pflasterkern enthaltenen Wirkstoffe Salicylsäure, Milchsäure, Saponine, Terpentin und Copaivabalsam unterstützt.

Inhaltsstoffe: Salicylsäure, Milchsäure, Lanolin, gelber Bienenwachs, Fichtenharz, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Rhizoma Iridis, Terpentintöl, Copaivabalsam (-öl), Klebstoff, Vlies, Papier.

Anwendung: Nach Anweisung anwenden. Zuerst die Schutzfolie abnehmen. Auf den reinen und trockenen Fuß das Plaster so anlegen, damit der Schutzring die Hühnerauge umfassen, wodurch es die krankhaft veränderten Stellen vor Druck und Schürfrungen sicherh sowie Linderung bringt. Das Plaster ist sorgfältig anzukleben, damit es die Rolle des oskulierten Verbandes erfüllt. Die sich im Vliesring befindende Masse mit der Salicyl- und Milchsäure sowie Hilfsstoffe erleichtern zusätzlich die Entfernung von Hühneraugen. Plaster bis zum Zeitpunkt anwenden, bis die Hühneraugen beseitigt sind, höchstens 10-14 Tage. Jedes Plaster ist für max. 24 Stunden aufzulegen. Nach Abschluss der Behandlung kann der Mittelteil der Hühneraugen durch warmes Fußbad mit Salz und Seife entfernt werden. Falls während der Behandlung die Haut überempfindlich wird und eine Rötung auftritt, mit der Anlegung nächster Plaster warten.

Vorsichtsmaßnahmen: Plaster zum äußeren, einmaligen, selbständigen Gebrauch ausschließlich auf die veränderte Haut (Hühneraugen) anbringen. Das Hühnerauge nicht berühren. Überempfindlichkeit gegen die Salicylsäure, Salicylsäure und jeden Inhaltsstoff des Pflasters, bei Säuglingen, Kindern, auf die kranke Haut (z.B. Entzündungszustände, Wunden, Hautausschlag), bei Patienten mit Nierenstörungen (Niereninsuffizienz), Diabetes-Patienten und Patienten mit schwachem Kreislauf und Entzündungen der Blutgefäße eingesetzt werden. Die Salicylsäure kann die Durchlässigkeit der Haut für andere lokal verwendete Medikamente erhöhen. Das Hühneraugenplaster Salicylsäure kann nicht mit der Schleimhaut in Berührung kommen. Besonders Augenkontakt vermeiden, nicht auf das Gesicht gebrauchen. Bei Schwangerschaft ist die Nutzung der Plaster bis auf die Bereiche, die kleiner als 5 cm² sind, zu begrenzen. Während der Stillzeit nicht auf die Brustbereiche anlegen. Bei Zweifeln ärztlichen Rat einholen.

Lagerung: An einem trockenen Ort, bei der Raumtemperatur, für Kinder unzugänglich lagern.

FR

COMFORT CORN - Les pansement pour les durillons avec l'acide salicylique

Format: 6 pansement pour les durillons avec l'acide salicylique

Les pansements pour les durillons avec l'acide salicylique sont conçus pour protéger contre les lésions cutanées douloureuses, protéger contre les pressions et les frottements et aider dans l'enlèvement efficace et sûr des durillons et des cors. Ils réduisent la pression sur l'endroit douloureux, apportant un soulagement immédiat. En portant le pansement longtemps et après avoir coupé le contact avec l'air, la peau devient douce et dans la crêpe s'accumule l'eau. Grâce à ce processus, la peau ou le conglomérat cellulaire kératinisé s'attendrit et devient facile à enlever. L'acide salicylique et l'acide lactique ainsi que les autres ingrédients du plâtre aident à éliminer le durillon. Le Copalifer contenu dans le pastille agit directement sur la callosité permetant l'éliminer en douceur.

Composition: acide salicylique, acide lactique, lanoline, cire d'abeille jaune, résine d'épinette, copolymère d'éthylène et acétate de vinyle, rhizome d'iris, essence de térbenthine, baume (huile) de Copaifera, colle, tissu, papier.

Mode d'emploi: Utilisez conformément à la notice. Enlevez d'abord le film protecteur. Appliquez le disque sur le pied propre et sec afin que l'anneau de protection entoure le durillon pour protéger la zone touchée contre la compression et le frottement, en apportant un soulagement immédiat. Le pansement doit être soigneusement collé, pour qu'il fonctionne comme un pansement occlusif. La pastille en tissu contenant de l'acide salicylique et de l'acide lactique ainsi que des auxiliaires facilitent l'élimination de la callosité. Appliquez le pansement jusqu'à l'enlèvement complet de la callosité, pendant au maximum 10-14 jours. Appliquez chaque pansement pour environ 24 heures. Après le traitement enlever la partie centrale du cor en appliquant aux pieds le bain chaud avec du sel et du savon. Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs et d'irritation de la peau.

Précautions d'emploi: Produit à l'usage externe et unique, seulement avec la peau altérée (la callosité). Contenant le produit actif, ce produit ne peut pas être utilisé sur une hypersensibilité à l'acide salicylique, aux salicylates et à tous les autres composants du pansement, chez les bébés, les enfants, en cas des maladies de peau (p. ex. inflammation, plaies, eczéma), chez les patients avec l'insuffisance rénale, chez les diabètes et les patients avec une mauvaise circulation sanguine ou une inflammation des vaisseaux sanguins. L'acide salicylique peut augmenter la perméabilité de la peau à d'autres médicaments appliqués localement. Éviter tout contact de l'acide salicylique avec la muqueuse. Éviter le contact avec des yeux, ne pas l'utiliser sur le visage. Ce produit est caustique. Ne pas se débarrasser en cas de contact de la zone de 5 cm². Pendant la lactation, il est interdit d'utiliser les pansements dans la zone des seins. En cas de doute, demander l'avis de votre pharmacien ou médecin.

Stockage: Conserver dans un endroit sec, à la température d'ambiance; ne pas laisser à la portée des enfants.

NL

COMFORT CORN - Lidoornpleisters met salicylzuur

Verpakking: 6 pleisters met salicylzuur voor lidoorns.

Anti-druk pleisters met salicylzuur beschermen de huid tegen druk en wrijving en helpen lidoorns veilig en effectief te verwijderen. De pleisters verlagen de druk op de aangedane plek en verlichten onmiddellijk de pijn ten gevolge van druk en wrijving. Door de pleisters langere tijd te gebruiken wordt de lidoorn afgesloten van lucht, de aangedaste huid wordt vochtig geïsoleerd en verzacht, keratine lost op. De veroorzaakte cellen verweken zodoende en kunnen dan gemakkelijk worden verwijderd. De actieve bestanddelen in de pleisterkern, salicylzuur, lactische acid, saponinen, terpentin en copaiva balsam bevorderen het verwijderen van de lidoorn.

Samenstelling: salicylzuur, lactische acid, lanoline, yellow wax, sparrenhars, poly(ethyleen-co-vinyl acetate), iriswortel, terpentine, copaiva balsam, lijkend, non-woven, papier.

Gebruik: Het product aanpassen zou aangetoond. Zorg ervoor dat de huid van de voet schoon en droog is voor het aanbrengen van de pleister. Verwijder eerst de beschermende laag aan de achterkant. Plaats de vellen ring rondom de lidoorn om de aangedane plek te beschermen tegen druk en wrijving, waardoor de pijn onmiddellijk zal worden verlicht. Zorg ervoor dat de pleister de hele lidoorn afsluit. De werkzame bestanddelen in het non-woven schijfje, waaronder salicylzuur en lactische acid, vergemakkelijken verwijdering van de lidoorn. Vervang de pleister na maximaal 24 uur. Bijlf de pleisters totdat de lidoorn is verdwenen, echter niet langer dan 10-14 dagen. Na beëindiging van de behandeling kan de kern van de lidoorn worden verwijderd in een warm voetbad met zout en zeep. Indien de huid tijdens de behandeling rond en gevoelig is, wacht dan met het aanbrengen van de volgende pleister.

Voorzorgsmaatregelen: De pleisters zijn bedoeld voor thuisgebruik en alleen voor uitwendig en eenmalig gebruik op de aangedane huid (lidoorn). Niet gebruiken bij: overgevoeligheid voor salicylzuur, salicylaten en alle andere bestanddelen van de lidoornpleisters, bij baby's en kinderen; op een beschadigde huid (bijv. infectie, wond, eczeem); bij patiënten met nierinsufficiëntie, diabetes, circulatoire problemen of een ontsteking van de bloedvaten. Salicylzuur kan de doorlaatbaarheid van de huid voor andere lokaal toegepaste medicijnen verhogen. Zorg dat de lidoornpleisters met salicylzuur niet in contact komen met de slijmvliezen. Vermijd vooral contact met de ogen en breng ze niet aan op het gezicht. Beperk het gebruik van de pleisters tijdens de zwangerschap tot een huidoppervlak van minder dan 5 cm². Pas de pleisters, bij het geven van borstvoeding, niet toe in de borststreek. Consulteer bij twijfel een arts.

Bewaren: Op een droge plaats bewaren, bij kamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen houden.

DK

COMFORT CORN - Ligtomteplastre med salicylsyre

Inhold: 6 ligtomteplastre med salicylsyre

Ligtomteplastre med salicylsyre er beregnet til at beskytte hudlæsioner mod smertefulde stød og hudskrabninger samt fremmer effektiv og sikker fjernelse af ligtorne. Plastrene fungerer som en lags støddæmpning ved at beskytte smertefulde steder på huden, hvilket giver en effektiv lindring. Højtidsplasteret isolerer huden i længere tid, bliver huden blød takket være begyndt tilførsel af luft, og kreatinen samler vandet op. På den måde bliver huden eller hornlaget mere blødt og kan nem fjernes. Plasterets ring, der indeholder salicylsyre mælkessyre samt saponin, terpentin og copaiva balsam fremmer fjernelsen af ligtorne.

Sammensætning: salicylsyre, mælkessyre, lanolin, gult bivoks, harpiks fra grantræet, copolymer af etylen og vinylacetat, irisjordstængel, terpentin, copaiva balsam (olie), klebstof, fiberstof, papir.

Anvendelse: Anvendes efter anvisning. Fjern beskyttelsesfilen først. Sæt plasteret på rent og tørt fød på den måde, at ringen fuldstændigt har dækket ligtornen, hvilket medfører, at plasteret fungerer som en lags støddæmpning, beskytter det smertefule sted på huden og giver en effektiv lindring. Højtidsplasteret isolerer huden i længere tid, bliver huden blød takket være begyndt tilførsel af luft, og kreatinen samler vandet op. På den måde bliver huden eller hornlaget mere blødt og kan nem fjernes. Plasterets ring, der indeholder salicylsyre mælkessyre samt saponin, terpentin og copaiva balsam fremmer fjernelsen af ligtorne.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.

Sikkerhedsregler: Ligtomteplastre er beregnet til udfortes, selvstændigt og engangsbrug og sættes kun på forandret hud (ligtorne). Ligtomteplastre er beregnet til brug af personer, der ikke har overfølsomhed over for salicylsyre, salicylater eller et andet anvendt stof eller hos små børn eller på svygd hud (fx inflammationer, sår, udslæt) eller hos patienter med diabetes, dårlig blodcirkulation og betændelsestilstande i blodkarene. Salicylsyre kan øge hudens gennemtrængelighed for andre medicin, der lokalt anvendes. Plasteret må ikke være i kontakt med slimhinde. Undgå i særdeleshed kontakt med øjne, plasteret må ikke sættes på ansigtet. Gravide kvinder kan ikke påføre plasteret. Hvis plasteret sættes på ansigtet, skal det fjernes efter 10-14 dage. Efter endelse af behandlingen, kan den midterste del af ligtornen ved at holde fødder i varmt bad med salt og sæbe. Bliver huden rød mens behandlingen forgår, afvent med at påsætte en ny plaster.